

L1**Numere iraționale (pagina 24)**

1. a) $\sqrt{4} = 2$ și $\sqrt{\frac{8}{18}} = \sqrt{\frac{4}{9}} = \frac{2}{3}$ sunt numere raționale, deoarece se pot scrie sub forma $\frac{a}{b}$,

cu $a \in \mathbb{Z}$, $b \in \mathbb{Z}^*$.

b) $\sqrt{3}$, $2\sqrt{7}$, $9 + \sqrt{12}$, $4 - \pi$, $\frac{\sqrt{5}}{2}$ sunt numere iraționale, deoarece nu se pot scrie sub forma

$\frac{a}{b}$ cu $a \in \mathbb{Z}$, $b \in \mathbb{Z}^*$.

2. a) Frațiile zecimale au o infinitate de zecimale care nu se repetă periodic.

b) Zecimalele numărului 0,135791113..... sunt numerele naturale impare consecutive, scrise în ordine crescătoare. Zecimalele numărului 0,1223334444..... sunt numerele naturale nenule, scrise în ordine crescătoare, fiecare număr n fiind scris de exact n ori.

3. Numărul \sqrt{a} este irațional dacă a nu este pătratul unui număr rațional, deci $\sqrt{a} \in \{\sqrt{2^5}, \sqrt{7^3}, \sqrt{8^{11}}\}$.

4. Dacă numărul natural n nu este pătrat perfect, atunci $\sqrt{n} \in (\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q})$.

$$2^2 < 8 < 3^2, 8^2 < 76 < 9^2, 13^2 < 193 < 14^2, 23^2 < 555 < 24^2, 31^2 < 1000 < 32^2.$$

Rezultă că numerele 8, 76, 193, 555, 1000 nu sunt pătrate perfecte.

5. a) $x \in \{1, 8, 92\}$ și numerele căutate sunt $\sqrt{1+8} = 3$, $\sqrt{8+8} = 4$, $\sqrt{92+8} = 10$;

b) $y \in \{0, 2, 3\}$ și numerele sunt $\sqrt{5-0} = \sqrt{5}$, $\sqrt{5-2} = \sqrt{3}$, $\sqrt{5-3} = \sqrt{2}$.

6. a) $\sqrt{7,31} = \frac{\sqrt{731}}{10} \in (\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q})$ deoarece 731 nu este pătrat perfect.

b) $\sqrt{10,4992} = \frac{\sqrt{6562}}{25} \in (\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q})$ deoarece 6562 nu este pătrat perfect.

7. a) $n \in \{0, 1, 2, 3, 4\}$ și $a \in \{3, 13, 23, 33, 43\}$;

b) Oricare ar fi $n \in \mathbb{N}$, numerele de forma $10 \cdot n + 3$ au ultima cifră 3 și nu sunt pătrate perfecte.

Rezultă $\sqrt{a} \in (\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q})$.

8. a) 100, 121, 144, 169, 196;

b) $\sqrt{100}$, $\sqrt{121}$, $\sqrt{144}$, $\sqrt{169}$, $\sqrt{196}$.

9. a) 0, 6, 10, 14, 18;

b) Oricare ar fi $n \in \mathbb{N}$, numerele de forma $4 \cdot n + 2 = 2 \cdot (2 \cdot n + 1)$ sunt divizibile cu 2 și nu sunt divizibile cu $2^2 = 4$, deci oricare ar fi $n \in \mathbb{N}$, $\sqrt{b} \in (\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q})$.

10. a) $\sqrt{67ab} \in \mathbb{Q}$, deci există $k \in \mathbb{N}$ cu $\overline{67ab} = k^2$.

$81^2 = 6561 < \overline{67ab} < 6889 = 83^2$. $82^2 = 6724$. $\overline{ab} = 24$ și $\sqrt{67ab} = 82 \in \mathbb{Q}$;

b) $\overline{7cd6} = n^2$ cu $u(n) \in \{4, 6\}$. Găsim $84^2 = 7056$, $c = 0$, $d = 5$ și $86^2 = 7396$, $c = 3$, $d = 9$.

$\sqrt{7cd6} = \sqrt{7056} = 84$ sau $\sqrt{7cd6} = \sqrt{7396} = 86$.